

好酸球性気道疾患特徴と治療

病名		喘息				咳喘息	アトピー咳嗽	喉頭アレルギー
炎症部位		下気道(末梢気管支)				下気道(末梢気管支)	下気道(中枢気道)	上気道(喉頭)
症状		喘鳴・呼吸困難伴う咳				喘鳴・呼吸困難 のない咳	気管支拡張薬の 効果を認めない咳	のどの痒みイガイガ
喘息治療ステップ		ステップ1	ステップ2	ステップ3	ステップ4			
治 療	吸入ステロイド [*]	◎	◎	◎	◎	◎	○	△
	内服ステロイド [*]	○	○	○	○	△	○	○
	LTRA	○	○	○	○	○	○	
	LABA		○	○	○	○	○	
	LAMA		○	○	○	○		
	テオフィリン製剤	○	○	○	○	○	○	
	抗IGE抗体薬					△		
	抗IL-5・抗IL-5R α 抗体					△		
	BT療法					△		
	追加	LTRA以外の抗ア剤	○	○	○	○		○(抗ヒスタミン剤)
発作	吸入SABA	○	○	○	○	○		
薬 剤 の 種 類	吸入ステロイド [*] ・フルチカゾン(フルタイド) [*] ・ベクロメタゾン(キュバール) [*] ・シクレソニド(オルベスコ) [*] ・ブデソニド(ハルミコート) [*] ・モメタゾン(アスマネックス)							
	内服ステロイド [*] ・プレドニゾン(プレドニン)							
	LTRA:ロイコトリエン受容体拮抗剤・モンテルカスト(キプレス・シングレア) [*] ・プラルンカスト(オノン)							
	LABA:長時間作用型 β_2 刺激剤 ①吸入薬1.サロメテロール(セレベント)2.ステロイド配合・アドエア [*] ・シブミコート [*] ・フルティフォーム [*] ・レルベア [*] ②経口薬・プロテカロール(メフチン) [*] ・ツロブテロール(ホクナリン) [*] ・ホルモテロール(アトック) [*] ・クレンプテロール(スピロベント)							
	LAMA:長時間作用性抗コリン剤・チオトロピウム(スピリーバ) [*]							
	テオフィリン製剤・テオフィリン(テオトル [*] ・テオロンク [*] ・ユニフィル)							
	LTRA以外の抗アレルギー剤・クモグリク(インタール) [*] ・スプラタストシル(アイピーティ) [*] ・抗ヒスタミン剤(H ₁ 受容体拮抗剤:オロパタジン [*] ・ベホタスチン [*] ・レボセチリン [*] ・その他)							
	吸入SABA・サルブタモール(サルタノール [*] ・アイロミール) [*] ・フロカテロール(メフチン [*] ・ベロテック)							
	抗IGE抗体薬・オマリスマブ(ゾレア皮下注)							
	①抗IL-5抗体・メポリスマブ(ヌーカラ皮下注) ②抗IL-5R α 抗体・ベンタリスマブ(ファセラ皮下注)							
BT治療・気管支熱形成術(気管支サーモプラスティ)								